



## 國際預防接種簡介

| 疫苗種類 | 流行性腦脊髓膜炎                             | 黃熱病                        |
|------|--------------------------------------|----------------------------|
| 接種劑量 | 每劑 0.5ml                             | 每劑 0.5ml                   |
| 禁忌   | 嚴重急慢性疾病、發燒、2歲以下。                     | 嚴重急慢性疾病、發燒、1歲以下、對蛋過敏及免疫缺損。 |
| 接種對象 | 赴流行性腦脊髓膜炎流行地區或國內民眾自費接種流行性腦脊髓膜炎疫苗之需求。 | 赴黃熱病流行地區或國內民眾自費接種黃熱病疫苗之需求。 |
| 接種時程 | 接種 1 劑                               | 接種 1 劑                     |
| 申請方式 | 1.民眾需備護照正(影)本。2.需事先預約。               |                            |
| 效期   | 3 年                                  | 10 年                       |
| 出發前  | 7 天                                  | 10 天                       |





| 疫苗種類 | Mefloquine                      | Doxycycline                        |
|------|---------------------------------|------------------------------------|
| 接種劑量 | 每錠 250mg                        | 每錠 100mg                           |
| 禁忌   | 癲癇、懷孕前 3 個月，體重 < 5kg            | 肝硬化、懷孕、8 歲以下                       |
| 接種對象 | 赴虐疾流行地區。(駐當地超過三個月則不建議服用)        |                                    |
| 接種時程 | 出發前一週先吃一錠，<br>每週一錠，<br>返國後持續四週。 | 出發前 1-2 天開始吃，<br>每天一顆，<br>返國後持續四週。 |
| 申請方式 | 至醫院掛號                           |                                    |
| 出發前  | 7 天                             | 1-2 天                              |





| 疫苗種類 | 狂犬病                                     | 小兒麻痺   | 日本腦炎                           |
|------|---|--|--------------------------------|
| 接種劑量 | 每劑 0.5ml                                | 每劑 0.5ml   | 3 歲以下：每劑 0.5ml<br>3 歲以上：每劑 1ml |
| 禁忌   | 急性疾病、發燒                                 | 急性疾病、發燒<br>Streptomycin 過敏                                 | 急性疾病、發燒                        |
| 效期   | 5 年                                     |  |                                |
| 出發前  | 28 天                                    | 8 週  | 2 週                            |
| 接種對象 | 暴露後：於狂犬病疫區遭溫血動物咬傷，返國後需完成後續疫苗接種劑次之民眾。    | 赴世界衛生組織 (WHO) 所列小兒麻痺流行地區工作或長期留駐當地等，經 CDC 評估特殊個案(不含一般旅遊民眾)。 | 赴日本腦炎流行地區或國內民眾自費接種日本腦炎疫苗之需求。   |
|      | 暴露前：經 CDC 評估後專案轉介之從事狂犬病相關動物實驗研究人員等特定對象。 |  |                                |





|      |   |                            |   |
|------|---|----------------------------|---|
| 接種時程 | 暴露後：第 0、3、7、14、28 (或 21) 天各接種 1 劑，共 5 劑。  | 接種 1 劑                     | 1. 成人接種時程：第 1、2 劑間隔 2 週，隔年接種第 3 劑。<br>2. 針對近期出國之急迫個案，建議接種時程為第 0、7、14 (或 30) 天各接種 1 劑，共 3 劑。 |
|      | 暴露前：第 0、7、28 (或 21) 天各接種 1 劑，共 3 劑。   |                            |   |
| 申請方式 | 暴露後：民眾需檢具身分證明文件正本、入出境紀錄影本、原始接種紀錄正(影)本或於遭咬傷地區之相關就醫紀錄等足茲證明之文件，填寫「狂犬病疫苗及免疫球蛋白申請表」提出申請，並由貴院開立診斷證明書。 | 民眾需檢具申請書，經 CDC 審核後轉介各委外醫院。 |   |
|      | 暴露前：民眾需檢具申請書，經 CDC 審核後轉介委外醫院。   |                            |   |

